

Las Paperas

¿Qué son las Paperas?

Las Paperas son una infección viral que puede causar el hinchar de las glándulas salivales de una persona infectada.

¿Quién puede tener las paperas?

Las paperas pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad que no ha tenido la enfermedad o que no ha recibido la vacuna.

¿Cómo se pasan las paperas?

El virus está en la saliva en una persona infectada y se pasa de persona a persona por el aire de modo de toser, destornudar o simplemente hablar. Las paperas son menos contagiosas que el sarampión y viruela.

¿Qué son los síntomas de las paperas?

La enfermedad comienza con una fiebre baja, dolor de cabeza, dolor de músculos y una sensación general incómoda. Normalmente el cachete y la mandíbula se hinchan de un o de los dos lados entre los primeros dos días de enfermedad.

¿Que tan pronto aparecen los síntomas después de contacto?

Los niños empiezan de mostrar los síntomas de paperas 2 a 3 semanas después de haber sido contagiados.

¿Como puede un doctor confirmar el virus es las paperas?

Paperas son confirmadas de parte de un análisis de sangre, orina o saliva.

¿Cuándo y por cuánto tiempo la persona puede pasar las paperas?

De 3 días antes del comienzo de síntomas, hasta el noveno día después del comienzo de los síntomas.

¿Cuáles son las complicaciones asociadas con paperas?

Niños menos de 2 años de edad usualmente tienen un caso leve de las paperas.

Casi 1 niño de 10 que tienen paperas también contrae la meningitis (una inflamación tapando el cerebro y la cuerda espinal). Ocasionalmente las paperas pueden causar encefalitis, una inflamación del cerebro.

Usualmente, el niño recupera sin daño permanente.

Los hombres juveniles o adultos que tienen paperas pueden desarrollar una hinchada de los testículos. La esterilidad es rara. Las paperas pueden causar sordera o muerte, pero es raro.

¿Hay tratamiento para las paperas?

No hay tratamiento específico para las paperas.

¿Se puede prevenir las paperas?

Sí. Una vacuna de paperas en combinación con la sarampión y la rubéola (la vacuna MMR) es recomendada para todos los niños de 12-15 meses y de 4-6 años. Las dos dosis de vacuna normalmente proveen la inmunidad por toda la vida.

¿Una infección pasada de paperas hace una persona inmune para la vida?

Sí. Se cree que una persona que tuvo la hinchada de solo un lado de la cara él/ella puede contraer paperas una segunda vez. Esto no es cierto.